



子どもの予防接種

指定医療機関にて個別に実施します
Immunization with your personal doctor

お問い合わせは健康づくり支援課へ
電話04-2956-8050

乳幼児期 に接種する予防接種 (実施期間: 通年)

予防接種を受けるには病気ごとに、それぞれ接種に適した時期があります。対象年齢内に、余裕を持って予防接種を進めましょう。
狹山市では防衛施設周辺整備交付金を一部活用し、麻しん風しん予防接種、4種混合、5種混合予防接種事業を行っています。

同じワクチンを接種する場合には、それぞれに決められた間隔があります。病気に対する抵抗力(免疫)をしっかりとつけるために、法律で定められた接種間隔を守りましょう。



ワクチン		接種可能年齢 ☐ 標準的な接種年齢 ☒ ○数字: 接種回数と接種時期の目安																			標準的な接種間隔		
		0か月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳																					
ロタウイルス (Rota Virus)		※ワクチンは2種類あります。 最初に受けたワクチンで決められた回数を受けます。																			生後2か月から14週6日までに1回目を接種し、前回の接種から27日以上の間隔をおいて、ワクチンにより決められた回数を接種		
ロタリックス(1価) ※2回接種 対象年齢: 生後6週0日～24週0日まで		① ②																					
ロタテック(5価) ※3回接種 対象年齢: 生後6週0日～32週0日まで		① ② ③																					
小児用肺炎球菌 (Streptococcus pneumoniae) 対象年齢: 生後2か月～5歳未満 ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により、接種回数が変わります。		① ② ③																			〈接種開始年齢〉 生後2か月以上7か月未満		初回: 生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加: 3回目の接種後、60日以上の間隔をおいて生後12か月～15か月未満の間に1回 (④) 接種
		① ②																			生後7か月以上12か月未満		初回: 生後12か月までに27日以上の間隔をおいて2回 (①②) 接種 追加: 2回目の接種後、60日以上の間隔をおいて生後12か月～24か月未満の間に1回 (③) 接種
		① ②																			1歳以上2歳未満		60日以上の間隔をおいて2回 (①②) 接種
		①																			2歳以上5歳未満		1回 (①) 接種
B型肝炎 (Hepatitis B) 対象年齢: 1歳未満		① ② ③																					生後2か月から27日以上の間隔をおいて2回 (①②) 接種後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回 (③) 接種
5種混合 (DPT-IPV-Hib) ジフテリア (Diphtheria) 百日せき (Pertussis) 破傷風 (Tetanus) ポリオ (Polio) ヒブ (Hib) 対象年齢: 生後2か月～7歳6か月未満 ※ヒブと4種混合を接種したお子さんは対象となりません		① ② ③																					初回: 生後7か月に至るまでに開始し、20日以上56日までの間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加: 初回接種終了後から6か月以上18か月までの間隔をおいて1回 (④) 接種
ヒブ(Hib) インフルエンザ菌b型 (Heamophilus Influenza Type b) 対象年齢: 生後2か月～5歳未満 ※5種混合を接種したお子さんは対象となりません ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により、接種回数が変わります。		① ② ③																			〈接種開始年齢〉 生後2か月以上7か月未満		初回: 生後12か月に至るまでに27日以上56日までの間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加: 3回目接種後7か月以上13か月までの間隔をおいて1回 (④) 接種
		① ②																			生後7か月以上12か月未満		初回: 生後12か月に至るまでに27日以上56日までの間隔をおいて2回 (①②) 接種 追加: 2回目接種後7か月以上13か月までの間隔をおいて1回 (③) 接種
		①																			1歳以上5歳未満		1回 (①) 接種