



子どもの予防接種

指定医療機関で個別に実施します
Immunization with your personal doctor

お問い合わせは健康づくり支援課へ
電話04-2956-8050

乳幼児期に接種する予防接種（実施期間：通年）

予防接種を受けるには病気ごとに、それぞれ接種に適した時期があります。対象年齢内に、余裕をもって予防接種を進めましょう。

狭山市では防衛施設周辺整備交付金を一部活用し、麻しん風しん予防接種、5種混合予防接種事業を行っています。

同じワクチンを接種する場合には、それぞれに決められた間隔があります。病気に対する抵抗力(免疫)をしっかりつけるために、法律で定められた接種間隔を守りましょう。



ワクチン	接種可能年齢 <input type="checkbox"/> 標準的な接種年齢 <input type="checkbox"/> ○数字：接種回数と接種時期の目安		標準的な接種間隔															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳
ロタウイルス (Rota Virus) ロタリックス(1価) ※2回接種 対象年齢：生後6週0日～24週0日まで ロタテック (5価) ※3回接種 対象年齢：生後6週0日～32週0日まで	※ワクチンは2種類あります。 最初に受けたワクチンで決められた回数を受けます。																	生後2か月から14週6日までに1回目(①)を接種し、前回の接種から27日以上の間隔をおいて、ワクチンにより決められた回数を接種
小児用肺炎球菌 (Streptococcus pneumoniae) 対象年齢：生後2か月～5歳未満 ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により接種回数が異なります	① ② ③																	<接種開始年齢> 生後2か月以上7か月未満 初回：生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回(①②③)接種 追加：3回目(③)の接種後、60日以上の間隔をおいて生後12か月～15か月未満の間に1回(④)接種
	① ② ③																	生後7か月以上12か月未満 初回：生後12か月までに27日以上の間隔をおいて2回(①②)接種 追加：2回目(②)の接種後、60日以上の間隔をおいて生後12か月～24か月未満の間に1回(③)接種
	① ②																	1歳以上2歳未満 60日以上の間隔をおいて2回(①②)接種
	①																	2歳以上5歳未満 1回(①)接種
B型肝炎 (Hepatitis B) 対象年齢：1歳未満	① ② ③																	初回：生後2か月から27日以上の間隔をおいて2回(①②)接種 追加：1回目(①)の接種から139日以上の間隔をおいて1回(③)接種
5種混合(DPT-IPV-Hib) ジフテリア(Diphtheria) 百日せき(Pertussis) 破傷風(Tetanus) ポリオ(Polio) ヒブ(Hib) 対象年齢：生後2か月～7歳6か月未満	① ② ③ ④																	初回：生後7か月に至るまでに開始し、20日以上56日までの間隔をおいて3回(①②③)接種 追加：初回接種終了後から6か月以上18か月までの間隔をおいて1回(④)接種
BCG 対象年齢：1歳未満	①																	生後5か月～8か月の間に1回(①)接種