



子どもの予防接種

指定医療機関にて個別に実施します
Immunization with your personal doctor

お問い合わせは健康づくり支援課へ
電話04-2956-8050



同じワクチンを接種する場合には、それぞれに決められた間隔があります。病気に対する抵抗力(免疫)をしっかりつけるために、法律で定められた接種間隔を守りましょう。

乳幼児期 に接種する予防接種 (実施期間: 通年)

予防接種を受けるには病気ごとに、それぞれ接種に適した時期があります。対象年齢内に、余裕を持って予防接種を進めましょう。
狹山市では防衛施設周辺整備交付金を一部活用し、麻しん風しん予防接種、4種混合、5種混合予防接種事業を行っています。

ワクチン	接種可能年齢 □ 標準的な接種年齢 ■ ○数字: 接種回数と接種時期の目安													標準的な接種間隔			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1歳	2歳		3歳	4歳	5歳
ロタウイルス (Rota Virus) ロタリックス(1価) ※2回接種 対象年齢: 生後6週0日~24週0日まで ロタテック(5価) ※3回接種 対象年齢: 生後6週0日~32週0日まで	※ワクチンは2種類あります。 最初に受けたワクチンで決められた回数を受けます。													生後2か月から14週6日までに1回目を接種し、前回の接種から27日以上の間隔をおいて、ワクチンにより決められた回数を接種			
小児用肺炎球菌 (Streptococcus pneumoniae) 対象年齢: 生後2か月~5歳未満 ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により、接種回数が変わります。	(接種開始年齢) 生後2か月以上7か月未満 ① ② ③													初回: 生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加: 3回目の接種後、60日以上の間隔をおいて生後12か月~15か月未満の間に1回 (④) 接種			
	生後7か月以上12か月未満 ① ② ③													初回: 生後12か月までに27日以上の間隔をおいて2回 (①②) 接種 追加: 2回目の接種後、60日以上の間隔をおいて生後12か月~24か月未満の間に1回 (⑤) 接種			
	1歳以上2歳未満 ① ②													60日以上の間隔をおいて2回 (①②) 接種			
	2歳以上5歳未満 ①													1回 (①) 接種			
B型肝炎 (Hepatitis B) 対象年齢: 1歳未満	① ② ③													生後2か月から27日以上の間隔をおいて2回 (①②) 接種後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回 (③) 接種			
5種混合 (DPT-IPV-Hib) ジフテリア (Diphtheria) 百日せき (Pertussis) 破傷風 (Tetanus) ポリオ (Polio) ヒブ (Hib) 対象年齢: 生後2か月~7歳6か月未満 ※ヒブと4種混合を接種したお子さんは対象となりません	① ② ③ ④													初回: 生後7か月に至るまでに開始し、20日以上56日までの間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加: 初回接種終了後から6か月以上18か月までの間隔をおいて1回 (④) 接種			
ヒブ(Hib) インフルエンザ菌b型 (Haemophilus Influenza Type b) 対象年齢: 生後2か月~5歳未満 ※5種混合を接種したお子さんは対象となりません ※接種開始年齢及び初回1・2回目の接種状況により、接種回数が変わります。	(接種開始年齢) 生後2か月以上7か月未満 ① ② ③ ④													初回: 生後12か月に至るまでに27日以上56日までの間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加: 3回目接種後7か月以上13か月までの間隔をおいて1回 (④) 接種			
	生後7か月以上12か月未満 ① ② ③													初回: 生後12か月に至るまでに27日以上56日までの間隔をおいて2回 (①②) 接種 追加: 2回目接種後7か月以上13か月までの間隔をおいて1回 (③) 接種			
	1歳以上5歳未満 ①													1回 (①) 接種			