

4種混合 (DPT-IPV) ジフテリア (Diphtheria) 百日せき (Pertussis) 破傷風 (Tetanus) ポリオ (Polio) 対象年齢：生後2か月～7歳6か月未満 ※5種混合を接種したお子さんは対象となりません		初回：20日以上56日までの間隔をおいて3回 (①②③) 接種 追加：初回3回目終了後、12か月以上18か月までの間隔をおいて1回 (④) 接種
BCG 対象年齢：1歳未満		生後5か月～8か月の間に1回 (①) 接種
麻疹風疹混合 (MR) 1期・2期 (Measles/Rubella) 対象年齢 1期：1歳～2歳未満 2期：小学校就学前年度のお子さん		1期：1歳になったらできるだけ早めに1回 (①) 接種 2期：小学校就学前年度の1年間 (令和6年4月1日～令和7年3月31日) に1回 (②) 接種
水痘 (みずぼうそう) (Varicella) 対象年齢：1歳～3歳未満		初回：1歳～1歳3か月の間に1回 (①) 接種 追加：1回目終了後、6か月から12か月までの間隔をおいて1回 (②) 接種
日本脳炎1期* (Japanese Encephalitis) 対象年齢：生後6か月～7歳6か月未満		1期初回：6日以上28日までの間隔をおいて2回 (①②) 接種 1期追加：1期初回2回目終了後6か月以上、おおむね1年の間隔をおいて1回 (③) 接種

学童期以降 に接種する予防接種 (実施期間：通年)

ワクチン	接種可能年齢 標準的な接種年齢 ○数字：接種回数と接種時期の目安											標準的な接種間隔
	9歳	10	11	12	13	14	15	16	17	18歳		
2種混合 (DT) 2期 ジフテリア (Diphtheria) 破傷風 (Tetanus)						①						11歳～12歳 ● 予診票は、満11歳になる誕生日の翌月に送付します。
日本脳炎2期* (Japanese Encephalitis)		①										9歳～10歳 ● 予診票は、満9歳になる誕生日の翌月に送付します。
ヒトパピローウイルス(HPV) (子宮頸がん) 2価・4価・9価ワクチン												中学1年相当、最初に受けたワクチンで2回目・3回目を接種 2価：1回目の1か月後に2回目、1回目の6か月後に3回目を接種 4価：1回目の2か月後に2回目、1回目の6か月後に3回目を接種 9価：1回目の2か月後に2回目、1回目の6か月後に3回目を接種 ● 予診票は、小学校6年の4月頃に送付します。

※日本脳炎の接種差し控えの影響を受けた方に対し、接種の機会が設けられています。

平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方 20歳の誕生日の前日までに、日本脳炎1期、2期の計4回を無料で接種できます。