

<b>B型肝炎</b> (Hepatitis B) 対象年齢：1歳未満		生後2か月から27日以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種
<b>4種混合(DPT-IPV)</b> ジフテリア(Diphtheria) 百日せき(Pertussis) 破傷風(Tetanus) ポリオ(Polio) 対象年齢：生後3か月～7歳6か月未満		初回:20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回接種 追加:標準的には初回3回目終了後、12か月以上18か月までの間隔をおいて1回接種
<b>BCG</b> 対象年齢：1歳未満		保健センターでの集団接種が原則です。上記日程で接種が難しい場合は、個別に医療機関で受けることも可能です。医療機関もしくは保健センターへお問い合わせください。 生後5か月～8か月の間に1回接種
<b>麻疹風疹混合(MR)1期・2期</b> (Measles/Rubella) 対象年齢： 1期：1歳～2歳未満 2期：小学校就学前年度の方		1期:1歳になったらできるだけ早めに1回接種 2期:小学校就学前年度の1年間(令和3年4月1日～令和4年3月31日)に1回接種
<b>水痘(みずぼうそう)</b> (Varicella) 対象年齢：1歳～3歳未満		初回:標準的には1歳～1歳3か月の間に1回接種 追加:標準的には1回目終了後、6か月から12か月までの間隔をおいて1回接種
<b>日本脳炎1期</b> ※ (Japanese Encephalitis) 対象年齢：生後6か月～7歳6か月未満		1期初回:6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種 1期追加:1期初回2回目終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回接種

## 学童期に接種する予防接種(実施期間:通年)

ワクチン	接種可能年齢											標準的な接種期間
	9歳	10	11	12	13	14	15	16	17	18歳		
<b>2種混合(DT)2期</b> ジフテリア(Diphtheria) 破傷風(Tetanus)												11歳～12歳 ●予診票は、満11歳になる誕生日の翌月に送付します。
<b>日本脳炎2期</b> ※ (Japanese Encephalitis)												9歳～10歳 ■日本脳炎ワクチン供給不足のお知らせ 日本脳炎ワクチンの製造が一時的に停止されているため、ワクチンが不足しています。4回接種のうち、1期の2回(1・2回目)を優先に接種しますので、2期対象者(9～13歳未満)への予診票の送付を当面差し控えます。
<b>HPV(子宮頸がん)</b> 2価ワクチンもしくは4価ワクチン												中学1年生相当 2価ワクチン接種の場合、3回(0、1、6か月後)接種 4価ワクチン接種の場合、3回(0、2、6か月後)接種 ●積極的な勧奨(予診票などの送付)を差し控えていますが、接種は可能です。希望する方は、医師と相談し、有効性とリスクをよく理解した上で受けてください。

※日本脳炎の接種差し控えの影響を受けた方に対し、接種の機会が設けられています。

**平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方**  
 20歳の誕生日の前日までに、日本脳炎1期、2期の計4回を無料で接種できます。

**平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方**  
 日本脳炎2期の対象時期(9歳～13歳未満)に、日本脳炎1期末接種分を無料で接種できます。